


# Phân loại 4 nhóm đối tượng khám sàng lọc trước tiêm vắc xin COVID-19

(Quyết định 2995/QĐ-BYT ngày 18 tháng 06 năm 2021)




## Đủ điều kiện tiêm chủng

- Người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào liệt kê trong thành phần của vắc xin.



## Chống chỉ định

- Có tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào.
- Có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất.



## Cần thận trọng tiêm chủng

Các đối tượng sau phải được khám sàng lọc kỹ và cần được tiêm chủng tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu:

- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.
- Người có bệnh nền, bệnh mạn tính được điều trị ổn định.
- Người mất tri giác, mất năng lực hành vi.
- Người trên 65 tuổi.
- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu.
- Người có bệnh mạn tính có phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống:
  - + Mạch: <60 lần/phút hoặc >100 lần/phút.
  - + Huyết áp tối thiểu <60 hoặc >90mmHg và/hoặc huyết áp tối đa <90 hoặc >140 mmHg.
  - + Nhịp thở >25 lần/phút và/hoặc SpO2 <94% (nếu có).

## Trì hoãn tiêm chủng

- Đang mắc bệnh cấp tính hoặc mạn tính đang tiến triển, chưa kiểm soát được.
- Những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan mất bù, ...
- Trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao (tương đương prednisolon  $\geq 2\text{mg/kg/ngày}$  trong  $\geq 7$  ngày), hoặc điều trị hóa trị, xạ trị.
- Đã từng mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng.
- Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ.

