

PHẢN ỨNG SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ASTRAZENECA

PHẢN ỨNG RẤT PHỔ BIẾN ($\geq 10\%$)



Đau đầu



Buồn nôn



Đau cơ



Đau khớp



Nhạy cảm đau



Đau, nóng tại vị trí tiêm



Ngứa



Mệt mỏi



Bồn chồn



Sốt*, ớn lạnh

PHẢN ỨNG PHỔ BIẾN

(từ 1% đến dưới 10%)



Sưng và đỏ tại vị trí tiêm

PHẢN ỨNG NGHIÊM TRỌNG**

(có thể xảy ra)




Phản vệ, phản ứng quá mẫn muộn

KHUYẾN CÁO



Tiêm đủ **2 liều** của cùng một loại vắc xin phòng COVID-19



Nên tiêm vắc xin phòng COVID-19 tối thiểu cách **14 ngày** với các vắc xin phòng bệnh khác

*Rất phổ biến là sốt nhẹ, phổ biến là sốt ≥ 38 độ C

**Hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa có đầy đủ dữ liệu



#BYT_nCoV
#ICT_anti_nCoV

